



Smokerlyzer®

Rauchometer™

Folgende Tabelle dient als ungefährer Anhaltspunkt für die Dosierung der Nikotinersatztherapie, bezogen auf die Messergebnisse mit den Smokerlyzern.

Unter Umständen können die hier empfohlenen Mengen nicht von jedem Raucher vertragen werden und es kann zu Unverträglichkeiten kommen.

Kontaktieren Sie in jedem Fall vor der Verwendung Ihren Arzt oder Apotheker, setzen Sie das Produkt bei Unverträglichkeiten sofort ab !

Stufe 1: Nicht erforderlich

(Nichtraucher) [0 – 6 ppm & %COHb < 0,7%]

Stufe 2: Nicht erforderlich

(Gefahrenbereich) [7 – 10 ppm & %COHb 0,7 - 2,0%]

Stufe 3: Geringe Menge

(Raucher) [11 – 15 ppm & %COHb 2,0 - 3,0%]

Pflaster mit ca. 10 mg Nikotin

oder

Kaugummi / Lutschpastillen mit ca. 2 mg Nikotin

Stufe 4: Geringe bis mittlere Menge

(Häufiger Raucher) [16 – 25 ppm & %COHb 3,0 - 4,0%]

Pflaster mit ca. 15 mg Nikotin

oder

Kaugummi / Lutschpastillen, Tabletten und Inhalatoren mit ca. 4 mg Nikotin

Stufe 5: Mittlere bis hohe Menge

(Abhängiger Raucher) [16 – 35 ppm & %COHb 4,0 - 6,0%]

Pflaster mit ca. 15 mg Nikotin

und

Kaugummi / Lutschpastillen, Tabletten und Inhalatoren mit ca. 2 mg Nikotin

Stufe 6: Hohe Menge

(stark abhängiger Raucher) [36 – 50 ppm & %COHb 6,0 - 9,0%]

Pflaster mit ca. 20 mg Nikotin

und

Kaugummi / Lutschpastillen, Tabletten und Inhalatoren mit ca. 2 mg Nikotin

Stufe 7: Höchste Menge

(Stark abhängiger Raucher mit hohem Gefährdungspotential) [>50 ppm & %COHb >9,0%]

Pflaster mit ca. 20 mg Nikotin

und

Kaugummi / Lutschpastillen, Tabletten, Inhalatoren und Nasenspray mit ca. 4 mg Nikotin

Specialmed GmbH
Tel.: +49 8731 / 3264130
Fax: +49 8731 / 3264930
E-Mail: info@specialmed.de
Page : www.specialmed.de